

BreathID[®] Hp

H. pylori 감염 진단을 위한
호흡 테스트



> 내시경 진단 불필요

> 정확한 결과

> 테스트 시간 10-15분

> 간편한 사용법

H. pylori 박테리아에 대한 자세한 정보
및 **BreathID[®] Hp** 호흡 테스트 정보는
www.breathid.com을 참조해 주십시오.

면책조항

본 안내문에서는 환자에게 필요한 일반적인 정보를 소개합니다. H. pylori 감염 진단을 위한 호흡 테스트가 환자에게 적합한지 여부는 담당 의사와 상담해 주십시오. 더 자세한 내용은 환자 팸플릿을 참조해 주십시오.

Exalenz
Breath-taking Solutions

전화: 1-888-EXALENZ
이메일: contact@exalenz.com
www.breathid.com

© 2013 Exalenz Bioscience, Inc. BreathID는 Exalenz Bioscience사(社)의 등록 상표입니다. 기타 제품명은 개별 회사의 등록 상표입니다

MTD00159 Rev. 01

감염 여부를 진단하는
유일한 방법은
호흡 테스트 ...



아래 증상으로 불편하십니까?

- 속쓰림 > 메스꺼움 > 헛배
- 구토 > 소화불량 > 복통

헬리코박터 파일로리(H. pylori) 박테리아에
감염되었는지 확인해 보십시오.

BreathID[®] Hp

담당 의사와 **BreathID[®] Hp** 호흡
테스트에 대해 상담해 주십시오.

BreathID[®] Hp는 사용이 편리하며 *H. pylori* 감염 진단 결과를 바로 확인할 수 있습니다.
테스트는 안전하고 신뢰할 수 있으며 10-15분 이내에 진단을 완료할 수 있습니다.

› *H. pylori* 박테리아는 무엇입니까?

*H. pylori*는 일반적으로 위(胃)에서 발견되는 박테리아입니다. 위 조직 세포의 손상과 염증의 원인이 될 수 있습니다.

› 어떤 위험이 있습니까?

박테리아가 위 세포에 기생하여 염증의 원인이 되거나 위산이 과다 분비될 수 있는 등 많은 위험이 관련되어 있습니다. 시간이 지나면, 감염으로 인해 펩틱 궤양과 위암 발생율이 높아질 수 있습니다.

› 감염 여부를 알 수 있습니까?

H. pylori 감염을 확인할 수 있는 특정한 증상은 없습니다. 메스꺼움, 복통, 위산 역류, 헛배, 트림 등의 증상이 수반될 수 있으며, 진단 테스트를 통해 감염 여부를 확인할 수 있습니다.

› **BreathID[®] Hp**는 어떻게 작동합니까?

의사는 **BreathID[®] Hp** 테스트를 통해 환자의 감염 여부를 확인할 수 있습니다. 테스트를 진행하려면 코(鼻)에 튜브를 대고 호흡합니다. 진단용 용액을 마신 후 튜브를 통해 다시 숨을 내뿜습니다. 담당 의사는 10-15분 이내에 결과를 확인하여 즉시 진단을 내릴 수 있습니다.



“ 전 세계 인구의 약 **2/3** 정도가 *H. pylori* 세균에 감염되어 있습니다. ”

CDC (Center for Control Disease and Prevention, 질병예방통제센터)

› *H. pylori* 세균에 감염되면 어떻게 치료합니까?

일반적으로 PPI(Proton Pump Inhibitor, 프로톤 펌프 억제제)와 함께 2가지 종류의 항생제를 복용하여 위산 분비를 줄이고 위 조직 내부의 상처를 치유합니다. 의약품 조합은 "3중 치료법"이며, 일반적으로 최대 14일 분량의 조제약을 처방합니다.

***H. pylori* 감염 여부를 확인할 수 있는 유일한 방법입니다.**

감염되었을지도 모른다는 생각이 드시면, 주치의와 진료예약을 하십시오. 특히, 우려되는 징후나 증상이 있는 경우, 현재 복용중인 의약품과 과거에 복용했던 의약품을 담당 의사에게 알려주십시오.

