

BreathID[®] Hp Test d'haleine pour le diagnostic de *H. pylori*



> Non invasif

> Durée : 10 à 15 min.

> Pratique

Pour plus d'informations sur *H. pylori* et sur le test d'haleine **BreathID[®] Hp**, veuillez consulter le site : www.breathid.com

Avis de non-responsabilité :

Cette brochure destinée aux patients est fournie uniquement à titre d'information générale. Consultez votre médecin pour savoir si le test d'haleine *H. pylori* est adapté à votre état de santé et au traitement correspondant à celui-ci. Reportez-vous à la description du test incluse dans la brochure patients.



Tél. : 1-888-EXALENZ
e-mail : contact@exalenz.com
www.breathid.com

© 2013 Exalenz Bioscience, Inc. BreathID est une marque déposée d'Exalenz Bioscience, Ltd. Les autres noms cités peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

MTD00113 Rév. 01

Il vous suffit de **souffler...**



Souffrez-vous de l'un de ces symptômes ?

- > Brûlures d'estomac > Nausées
- > Ballonnements > Vomissements
- > Indigestions > Maux d'estomac

Vous pouvez être infecté par *Helicobacter pylori* (*H. pylori*)

BreathID[®] Hp

Demandez conseil à votre médecin au sujet
du test **BreathID[®] Hp**

BreathID[®] Hp est un moyen simple, rapide et pratique pour déterminer si vous souffrez d'une infection à *H. pylori*. Ce test extrêmement fiable peut être effectué au cabinet de votre médecin en **10 à 15 minutes** seulement.

› Qu'est-ce que *H. pylori* ?

H. pylori est une bactérie souvent présente dans l'estomac. Elle peut provoquer des inflammations et des lésions sur la muqueuse de l'estomac.

› Quels sont les risques ?

Plusieurs risques sérieux sont à envisager : la bactérie peut s'ancrer aux cellules de l'estomac en provoquant une inflammation de celui-ci, et elle peut stimuler une production excessive d'acide gastrique.

› Suis-je infecté ?

Il n'existe pas de symptôme unique de l'infection à *H. pylori* car celle-ci peut se traduire par des nausées, des douleurs abdominales, des reflux, des ballonnements ou des éructations. Seul un test diagnostic peut déterminer si vous souffrez de cette infection.

› Comment fonctionne le test *BreathID[®] Hp* ?

Grâce au test *BreathID[®] Hp*, votre médecin peut détecter si vous êtes infecté. Pour effectuer le test, vous devez souffler normalement dans une canule nasale, boire une solution liquide spécifique puis souffler à nouveau dans la canule. Les résultats sont disponibles au bout de 10 à 15 minutes, et votre médecin peut immédiatement proposer un traitement.

Le test constitue le seul moyen de déterminer avec certitude si vous êtes infecté par *H. pylori*.

Si vous ressentez des signes ou des symptômes qui vous préoccupent, et si vous pensez être infecté par *H. pylori*, parlez-en à votre médecin et indiquez-lui les médicaments que vous prenez ou que vous avez pris.



« Environ **2/3** de la population mondiale est infectée par *H. pylori*. »

CDC (Centre pour le contrôle et la prévention des maladies)

› Comment est traitée l'infection à *H. pylori* ?

Généralement, deux types d'antibiotiques sont prescrits parallèlement à un IPP (inhibiteur de la pompe à protons), afin de réduire la production d'acide gastrique et de permettre la guérison de la paroi de l'estomac. Cette association de médicaments, appelée « trithérapie », est habituellement prescrite pour une durée maximale de 14 jours.

